

**PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS DE
LLISTAT DE DOCUMENTS ANNEXOS AL PGIF**

**MANUAL D'AVALUACIÓ I DECISIÓ ESTRATÈGICA EN
LA GESTIÓ D'ASSENTAMENTS DE GATS
COMUNITARIS**

TÍTOL DEL DOCUMENT:	MANUAL D'AVALUACIÓ I DECISIÓ ESTRATÈGICA EN LA GESTIÓ D'ASSENTAMENTS DE GATS COMUNITARIS
CODI:	MAN-EVAL-001 (Model Genèric)
VERSIÓ:	1.0

1. Fonament i Objecte Del Manual

El present Manual estableix el marc estratègic i la metodologia per a la presa de decisions en la gestió de les poblacions de gats comunitaris. El seu objecte és garantir que tota intervenció es basi en un diagnòstic previ, objectiu i multidimensional, permetent una assignació eficient de recursos i l'aplicació dels Procediments Operatius Estratègics (d'ara endavant, POEs) més adequats per a cada situació, basant-se en l'evidència científica i tècnica.

Aquest sistema és l'instrument principal per donar compliment al Capítol VI, *Colònies felines*, de la Llei 7/2023, de 28 de març, que exigeix a les entitats locals desenvolupar Programes de Gestió que siguin garants del benestar animal, respectuosos amb la salut pública i compatibles amb la protecció de la biodiversitat, sota els protocols marc i requisits que ha desenvolupar la comunitat autònoma.

La metodologia emprada en el desenvolupament del present Pla s'alinea amb les directrius de la DGDA i els estàndards d'organismes com la ISFM (International Society of Feline Medicine).

2. Metodologia de risc (doble eix)

El principi metodològic per el diagnòstic d'un assentament es realitza en dues fases seqüencials:

© CARELIAVET – Document tècnic registrat. Ús restringit. Prohibida la còpia, difusió o modificació sense autorització expressa.

Fase 1: Classificació Estratègica (Doble Eix de Risc)

Primer, es realitza un diagnòstic qualitatiu basada en la *UBICACIÓ DE L'ASSENTAMENT* per determinar l'estratègia general a seguir. D'aquesta manera, l'assentament es valorat segons:

Classificació per Risc Ecològic: Es determina si l'emplaçament és Tipus A, B o C.

Classificació per Risc Sanitari-Social: Es determina si l'emplaçament és Nivell 1, 2 o 3.

Fase 2: Priorització de la Intervenció (Sistema de Puntuació SP-PICF)

Un cop classificada l'agrupació, s'utilitza el Sistema de Puntuació per a la Priorització (SP-PICF) per obtenir un valor numèric que determina la urgència de la intervenció, en funció de diferents criteris avaluable. Aquesta eina permet ordenar les actuacions quan hi ha múltiples colònies dins la mateixa categoria de risc.

2.1. EINES DE DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ

El Sistema D'avaluació I Classificació Per Risc

El tipus de gestió de cada assentament felí es decidirà en funció d'un diagnòstic basat en l'avaluació de dos eixos de risc independents i simultanis: el Risc Ecològic i el Risc Sanitari-Social.

EIX 1-CLASSIFICACIÓ PER RISC ECOLÒGIC (TIPUS A, B, C)

Aquest eix avalua la ubicació geogràfica del punt d'alimentació i l'impacte potencial de la presència d'individus sobre els ecosistemes i la fauna silvestre.

El principi subjacent és que el nivell de protecció d'un hàbitat determina el tipus de gestió felina aplicable.

Nivell Ecològic	Descripció del Risc	Criteris de Classificació de l'Emplaçament
TIPUS A	Risc CRÍTIC. La presència d'una colònia és científicament incompatible amb els objectius de conservació de l'espai. El gat (<i>Felis catus</i>) actua aquí com una Espècie Exòtica Invasora (EEI) segons la definició de la UICN i la normativa aplicable a espais protegits.	Ubicació a zones protegides i/o vulnerables, sòl rústic protegit, àrees d'interès, sòl rústic forestal o enclavaments amb poblacions d'espècies endèmiques vulnerables a la depredació. Zones incloses a la Llei 42/2007 i la Llei 5/2005. Qualsevol hàbitat designat com a crític per l'autoritat ambiental i/o els serveis tècnics municipals que sigui incompatible amb la presència de depredadors generalistes.
TIPUS B	Risc ALT. La colònia no està en una zona de màxima protecció, però la seva proximitat crea una "pressió de vora" i un risc de dispersió cap a hàbitats sensibles, actuant com una font	Ubicació en sòl rústic comú i/o qualsevol zona que sigui confrontant o propera (<500m) a una Zona de TIPUS A o dels corredors ecològics que les connectin. Les catalogades com Àrees de Transició.

	d'individus que poden colonitzar Zones de Tipus A.	
TIPUS C	Risc BAIX. Entorn fortament antropitzat on l'impacte sobre la biodiversitat pot ser menor. La prioritat que s'estableix és la convivència ciutadana i de la fauna urbana amb la presència de gats comunitaris i el seu benestar.	Ubicació en sòl urbà consolidat , polígons industrials o zones rústiques no classificades com tipus A o B.

EIX 2 - CLASSIFICACIÓ PER RISC SANITARI-SOCIAL (NIVELLS 1, 2, 3)

Aquest eix avalua l'entorn social immediat de la colònia i el seu potencial per generar conflictes de salut pública i convivència, basant-se en el principi d'Una Sola Salut" (One Health), que reconeix la interconnexió entre la salut humana, la salut animal i la de l'entorn.

A Santa Eulària l'estacionalitat turística i la presència d'espais d'ús massiu requereixen l'ajust de la taula.

Nivell Sanitari-Social	Descripció del Risc	Criteris de Classificació de l'Emplaçament
NIVELL 1	Risc ALT. Entorns de màxima sensibilitat humana on la percepció de risc i l'exigència d'asèpsia i salubritat són màximes. Una mala gestió aquí pot comprometre la salut o seguretat de poblacions humanes vulnerables i generar un conflicte social greu.	Ubicació EN o ADJACENT (<200 metres) a: Centres sanitaris o sociosanitaris (hospitals, residències de gent gran). Centres educatius. Parcs infantils amb sorrencs. Zones de manipulació d'aliments a l'aire lliure (terrasses de restaurants, mercats).
NIVELL 2	Risc MODERAT. Entorns d'alta densitat i interacció humana on la gestió deficient d'una colònia pot provocar molèsties significatives i conflictes veïnals recurrents.	Ubicació en entorns urbans d'alta densitat , zones turístiques, interiors de patis d'illa o comunitats de propietaris.
NIVELL 3	Risc BAIX. Entorns de baixa o nul·la interacció humana directa, on la gestió pot centrar-se en el benestar dels propis animals.	Ubicació en polígons industrials, solars aïllats i zones despoblades sense habitatges propers.

3. Fase 2: Sistema de puntuació (SP-PICF: Sistema de Puntuació per a la Priorització d'Intervenció en Colònies Felines)

ÀREA 1: BENESTAR ANIMAL (Puntuació màxima: 30 punts) Aquesta àrea avalua el nivell de benestar i risc directe per als individus de la colònia.

(La puntuació de cada criteri se suma per obtenir la puntuació total de l'àrea)

Criteri	Puntuació	Descripció
1.1. Presència d'Individus Vulnerables	0-10	
	0	No s'observen cadells, femelles gestants/lactants ni individus malalts/ferits.
	5	Presència d'individus joves (sub-adults), però sense signes de vulnerabilitat crítica.
	10	Crític: Múltiples camades, femelles gestants, i/o diversos individus greument malalts/ferits/caquèctics.
1.2. Condició Corporal Mitjana (BCS)	0-10	
	0	La majoria de la colònia presenta una condició corporal ideal (BCS 3/5).
	5	La majoria de la colònia es troba prima (BCS 2/5).
	10	Crític: Una proporció significativa (>25%) de la colònia presenta desnutrició severa (BCS 1/5).
1.3. Riscos Ambientals Directes	0-10	
	0	Entorn segur sense perills evidents (ex. atropellaments, enverinaments, violència, falta de refugis).
	5	Presència de riscos lleus o esporàdics (ex. trànsit moderat proper, poca disponibilitat de refugis naturals).
	10	Crític: Riscos greus i constants per a la vida dels animals (ex. carreteres amb alt trànsit, presència documentada d'enverinaments, violència sistemàtica, absència total de refugis i/o aigua).

En mesos posteriors a la temporada alta (setembre-novembre), es considerarà *vulnerabilitat addicional* la presència de joves desatesos o cadells procedents d'alimentació estacional irregular. Això justifica pujar 5 punts quan es detectin "cadells d'origen estacional".

ÀREA 2: IMPACTE SOBRE LA BIODIVERSITAT (Puntuació màxima: 20 punts)

Aquesta àrea avalua el potencial impacte negatiu de la presència d'individus sobre la fauna silvestre local, especialment en entorns naturals o de transició.

CRITERI	PUNTUACIÓ	DESCRIPCIÓ
2.1. Ubicació d'assentament	0-10	
	0	L'assentament es troba en una Zona de Tipus C (Risc Baix) .
	5	L'assentament es troba en una Zona de Tipus B (Risc Alt / Amortiment) .
	10	Crític: L'assentament es troba en una Zona de Tipus A (Risc Crític) .
2.2. Evidència de Depredació	0-10	
	0	No hi ha evidència de depredació de fauna silvestre per part dels gats de la colònia.
	5	Indicis ocasionals (ex. restes d'aus o petits rosegadors a la zona d'alimentació, avistaments esporàdics de gats caçant).
	10	Crític: Depredació documentada i significativa sobre espècies protegides, en perill d'extinció, o en poblacions sensibles (ex. nius, colònies d'aus protegides, espècies de micromamífers vulnerables).

ÀREA 3: SALUBRITAT I SALUT PÚBLICA (Puntuació màxima: 20 punts)

Aquesta àrea avalua la situació en quant a salut pública i ambiental del punt d'alimentació habitual i el seu entorn

Criteri	Puntuació	Descripció
3.1. Gestió d'Excretes i Higiene de l'Entorn	0-10	
	0	Entorn net i lliure d'excrements i restes d'aliment, amb pràctiques d'alimentació i higiene adequades (recollida diària de restes, menjadors i abeuradors nets).
	5	Presència ocasional d'excrements o residus d'aliments a la zona, olors esporàdiques, o pràctiques d'alimentació millorables (ex. menjar tot el dia).
	10	Crític: Falta severa d'higiene, acumulació constant i visible d'excrements i residus orgànics, olors persistents i fortes, presència de vectors (rates, paneroles) atrets per la mala gestió.
3.2. Malalties Infeccioses / Paràsits	0-10	
	0	No hi ha signes aparents de malaltia contagiosa o infestació parasitària a la colònia.
	5	Presència de paràsits externs (puces, paparres) lleus o signes clínics molt localitzats (ex. conjuntivitis lleu, esternuts aïllats).
	10	Crític: Brots evidents de malalties infeccioses (ex. rinotraqueïtis felina, calicivirus amb afecció sistèmica), sarna generalitzada, o gran part de la colònia afectada per paràsits interns/externs.

ÀREA 4: CONVIVENCIA SOCIAL I COMUNITARIA (Puntuació màxima:30 punts)

Aquesta àrea avalua el nivell de conflicte o molèsties generades per la presència de gats comunitaris al voltant en la comunitat humana.

Criteri	Puntuació	Descripció
4.1. Nivell de Conflicte Veïnal	0-10	
	0	No hi ha queixes, denúncies ni conflicte veïnal registrat o perceptible. La convivència és harmoniosa.
	5	Molèsties ocasionals o queixes verbals aïllades (ex. per soroll nocturn, olors lleus, presència de gats en zones no desitjades).
	10	Crític: Conflicte obert amb queixes formals registrades, denúncies municipals o policials, amenaces d'actuacions no regulades per part de veïns, forta oposició a la presència de la colònia.
4.2. Ubicació i Sensibilitat Social	0-10	
	0	L'assentament es troba en una Zona de Nivell 3 (Risc Baix)
	5	L'assentament es troba en una Zona de Nivell 2 (Risc Moderat)
	10	Crític: L'assentament es troba en una Zona de Nivell 1 (Risc Alt)
4.3. Estructura de Gestió Existent	0-10	
	0	Hi ha cuidadors identificats, organitzats, col·laboradors i que apliquen bones pràctiques de gestió.
	5	Existeixen cuidadors no acreditats o amb una col·laboració irregular.
	10	Crític: Absència total de cuidadors identificats o negativa explícita a col·laborar.

La suma de les puntuacions de les quatre àrees permet obtenir una Puntuació de Prioritat d'Intervenció (SP-PICF). Aquesta puntuació total classifica la colònia en diferents nivells de prioritat, determinant la urgència de l'acció.

Puntuació Total (Màx. 100 punts)	Nivell de Prioritat	Justificació	Acció Recomanada
> 70	CRÍTICA	Situació de greu risc per al benestar animal, la biodiversitat local, la salut pública o amb un conflicte social insostenible. Requereix una intervenció immediata i urgent.	Planificació i execució al més aviat possible. Assignació prioritària i mobilització màxima de recursos.
41 - 70	ALTA	La colònia presenta problemes significatius en una o diverses àrees que, si no s'aborden, empitjoraran. Requereix una intervenció decidida en el curt termini.	Planificació per a intervenció en el curt termini
20 - 40	MEDIA	Colònia relativament estable, però que requereix control i gestió per evitar el seu deteriorament futur i consolidar les bones pràctiques.	Planificació a mitjà termini inclosió en campanyes programades d'esterilització i gestió.
< 20	BAIXA / SEGUIMENT	Colònia ben controlada i amb baix impacte en totes les àrees. No requereix una intervenció urgent ni grans recursos. Es manté sota observació i suport als cuidadors.	Només seguiment periòdic, suport puntual a cuidadors i manteniment de les bones pràctiques implementades.

L'encreuament d'ambdós resultats determinarà l'estratègia de gestió a seguir. L'aplicació d'aquest sistema es detalla al POE 1.1: Procediment d'Avaluació Inicial i Aplicació del Manual de Decisió.

