

PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS

LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS

GUIA DE MANEIG DE BAIX ESTRÈS

Finalitat: Aquesta guia té com a objectiu proporcionar al personal de camp (equips de captura, voluntaris) i al personal clínic les pautes tècniques fonamentals per minimitzar la por, l'ansietat i l'estrès dels gats comunitaris durant tots els processos de maneig, des de la captura fins al retorn.

L'aplicació d'aquestes tècniques no és una opció, sinó un **requisit obligatori de benestar animal** en totes les actuacions del PGIF.

1. PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA ETOLOGIA FELINA

Per a manipular un gat comunitari de manera efectiva, primer hem d'entendre'l. Aquests animals es regeixen per un instint de supervivència molt arrelat.

El Gat com a Presa i Depredador: Un gat és alhora un caçador i una presa potencial. Quan se sent amenaçat, la seva resposta instintiva no és l'agressió, sinó la **fugida i l'ocultació**. Només lluitarà com a últim recurs, quan se senti acorralat i sense escapatòria.

La Importància del Control: L'estrès en un gat es dispara quan perd el control sobre el seu entorn i les seves decisions. El nostre objectiu és donar-li sempre una **sensació de control percebuda**, fins i tot quan està dins d'una gàbia.

Sensibilitat Sensorial: Els gats tenen uns sentits de l'oïda i l'olfacte extremadament aguts. Els sorolls forts, els moviments bruscos i les olors desconegudes o amenaçadores (com l'olor d'un gos o d'un altre gat estressat) són factors desencadenants d'estrès massiu.

2. PROTOCOL DE BAIX ESTRÈS DURANT LA CAPTURA

La captura és el moment de màxim estrès. Una bona tècnica aquí és crucial.

Preparació de l'Entorn:

	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data:
	PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS		Pàgina 2 de 3

Calma i Silenci: Les operacions de captura s'han de realitzar en un ambient de màxima tranquil·litat. Cal evitar crits, converses en veu alta i sorolls innecessaris.

Mínima Presència Humana: Només el personal estrictament necessari ha d'estar present. La presència d'espectadors o personal no format genera tensió.

Ús de la Gàbia Trampa:

Supervisió Constant: Mai, sota cap circumstància, s'ha de deixar una gàbia trampa sense supervisió. L'objectiu és cobrir-la immediatament després que el gat hagi entrat.

"Tapar és Calmar": En el moment en què la trampa es tanca, el primer gest ha de ser **cobrir la gàbia completament** amb una tela opaca i transpirable (una tovallola vella, una manta lleugera).

Això elimina l'estrès visual i li dona a l'animal la sensació d'estar amagat, la qual cosa redueix dràsticament els seus nivells de pànic.

Manipulació de la Gàbia: La gàbia s'ha de moure amb suavitat, sense cops ni moviments bruscos. S'ha de portar sempre en posició horitzontal.

3. PROTOCOL DE BAIX ESTRÈS DURANT EL TRANSPORT

Vehicle Adequat:

El transport s'ha de fer en un vehicle tancat, ben ventilat i climatitzat (evitar temperatures extremes).

Seguretat i Estabilitat:

Les gàbies han d'estar correctament assegurades per evitar que es moguin o bolquin durant el trajecte. S'han de col·locar sobre una superfície estable.

Ambient Sensorial Neutre:

S'ha d'evitar la música alta, les frenades brusques i els cops de porta. S'ha de evitar (si es pot) transportar gossos al mateix espai que els gats.

L'ús de difusors de feromones facials felines sintètiques (ex. Feliway®) al vehicle abans del transport és altament recomanable.

Separació Visual:

Si es transporten diversos gats, les gàbies han d'estar cobertes individualment per evitar el contacte visual directe, ja que també pot ser una font de conflicte i estrès.

4. PROTOCOL DE BAIX ESTRÈS A LA CLÍNICA I DURANT LA RECUPERACIÓ

Zona d'Espera:

Els gats comunitaris han d'esperar en una zona tranquil·la, separada visualment i auditivament de gossos i d'altres gats domèstics.

Han de romandre a les seves gàbies cobertes fins al moment de la sedació.

Maneig Mínim:

La manipulació de l'animal conscient ha de ser la mínima indispensable.

La sedació s'ha d'administrar de la manera menys invasiva possible (ex. a través de la reixa de la gàbia si el protocol veterinari ho permet).

Recuperació:

	AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU	Versió: 1	Data:
	PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DE GATS COMUNITARIS LLISTAT DE PROTOCOLS I PROCEDIMENTS OPERATIUS		Pàgina 3 de 3

El despertar de l'anestèsia s'ha de produir en un entorn càlid, fosc i silenciós.

L'animal ha de romandre a la seva gàbia, coberta, fins que estigui completament recuperat.

5. PROTOCOL DE BAIX ESTRÈS DURANT EL RETORN

Punt de Retorn Exacte:

L'animal ha de ser alliberat **exactament al mateix lloc on va ser capturat**. Deixar-lo a pocs metres de distància pot desorientar-lo i generar un estrès greu.

Moment de l'Alliberament:

S'ha de fer en hores de baixa activitat humana (a primera hora del matí o al capvespre) per permetre que el gat es reorienti amb tranquil·litat.

Procediment d'Alliberament:

Col·locar la gàbia a terra, apuntant cap a una zona de refugi coneguda (un arbust, un punt d'amagatall). Obrir la porta de la gàbia amb suavitat i retirar-se uns metres per permetre que el gat surti al seu propi ritme, sense sentir-se pressionat.

ESBORRANY